


Výživové aditivum

Výrobce: AgroProtec s.r.o. Kamenný Újezd, Dolní 549,
okres České Budějovice, PSČ 373 81

AGROSTIM FORTE



Zdraví škodlivý

Registrant a dovozce: AgroProtec s.r.o. Kamenný Újezd, Dolní 549, okres České Budějovice, PSČ 373 81

Číslo rozhodnutí o registraci: 2914

Doba použitelnosti: 4 roky od data výroby v původních obalech při dodržení podmínek skladování.

Datum výroby/číslo šarže/použitelné do: uvedeno na obalu

Hmotnost obalové jednotky: 10 litrů

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost	hodnota
Celkový obsah dusíku jako N v % min.	4,0
Celkový obsah draslíku jako K ₂ O v % min.	2,5
Celkový obsah kyseliny alfa-naftyloctové jako NAA v g/l min.	6,5
Měrná hmotnost - hustota při 20 °C v kg/m ³	1100
Hodnota pH	od 9,0 do 10,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity: v mg/kg pomocného rostlinného přípravku: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Kyselina alfa-naftyl octová patří do skupiny auxinů, které jsou přirozenými hormony v rostlinách. Ovlivňuje metabolismus rostlin a buněčné dělení. Aminokyseliny, které jsou součástí formulace zlepšují adhesivní vlastnosti a významně omezují skapávání přípravku z povrchu plůdků a listů, podporují růst a vývoj jablek nejvyšší kvality.

Kapalný koncentrát AGROSTIM FORTE je vyvinutý a určený především na podporu tvorby vysoce kvalitních plodů jablek.

Je možné ho však užít jako účinné výživové aditivum také v souvislosti s pěstováním dalších ovocných dřevin. Přípravek AGROSTIM FORTE se aplikuje v době, kdy největší plody v růžici mají průměr 10 až 12 mm, tj. asi 10 až 15 dní po odkvětu. Nejlepšího účinku je možno dosáhnout, když se postřík aplikuje za teplého počasí (min. 16 °C) a při co nejvyšší vlhkosti vzduchu. Nejlepší je přípravek aplikovat brzy ráno nebo vpoledne. Pro aplikaci je třeba volit co nejjemnější postřík, aby se dosáhlo dokonalého zvlhčení listů a plodů. Aplikaci není vhodné realizovat za chladného nebo příliš teplého počasí.

Dávkování přípravku:

Na hektar je možné doporučit dávku 4-6 litrů přípravku AGROSTIM FORTE, přičemž uvedené množství je vhodné aplikovat v asi 800 až 1500 litrech aplikačního roztoku (v závislosti na kvalitě postříku). Nižší dávku přípravku (4-5 l) je vhodné použít u odrůd: Red Delicious, Kids Orange, Jonathan, Jonagold, Rosen, Spartan, Starkling, Starkrimson, Stayman Red a Summered. V případě odrůd Cox Orange, Elstar, Golden Delicious, Idared, Maigold, Parména zlatá, Primerouge a Boskopské se doporučuje použít vyšší dávku přípravku (5-6 l). Přípravek AGROSTIM FORTE je účelné používat v případě zdravých, dobře rodících stromů, které bohatě zakvetly a byly také dobře opyleny.



AgroProtec

Výživové aditivum

AGROSTIM FORTE



Aplikaci přípravku AGROSTIM FORTE je vhodné kombinovat s aplikací smáčedla Agrovital v dávce 0,3 l/ha (0,03 %) zejména v období bohatém na dešťové srážky.

Příprava aplikačních roztoků:

Odměřené množství přípravku se za účinného míchání pomalu vlije do nádrže postřikovače naplněného asi do poloviny až dvou třetin vodou. Po důkladném promíchání obsahu postřikovače se doplní potřebné množství vody.

Zneškodňování obalů a zbytků:

Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci do separovaného sběru. Větší obaly po důkladném vyprázdnění spalte ve schválené spalovně. Oplachovou vodu použijte na přípravu postřikové kapaliny. Případné zbytky postřikové směsi vylijte do mělké rýhy na ošetřeném pozemku. Po skončení práce vypláchnout nádrž postřikovače vodou, resp. vodním roztokem čistícího přípravku. Přípravek ani jeho zbytky a oplachové vody nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Asanace: aplikační zařízení, osobní ochranné pracovní prostředky a pomocné nádoby asanujte za použití čistících přípravků.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zdraví škodlivý.

Dráždí oči a kůži (**R36//38**).

Poškozuje zdraví při požití (**R 22**).

Uchovávejte mimo dosah dětí (**S2**).

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (**S20/21**).

Zamezte styku s kůží a očima (**S24/25**).

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (**S36/37**).

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (**S26**).

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (**S28**).

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (**S13**).

Při náhodném požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (**S46**).

Uchovávejte v originálním obale (**S49**).

Skladování:

Skladujte v původních, dobře uzavřených a neporušených obalech v krytých, větraných, hygienicky čistých a uzamykatelných skladech odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků, hořlavín i obalů od těchto látek.



AgroProtec