

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

TIMPANI

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně pšenice ozimé proti bráničnatce pšeničné a ječmene ozimého proti rhynchosporiové skvrnitosti.

Účinná látka: chlorothalonil 250 g/l; 22,0% hmot
tebukonazol 90 g/l; 7,92% hmot.

Další nebezpečné látky obsažené v přípravku: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on

H317	MŮŽE VYVOLAT ALERGICKOU KOŽNÍ REAKCI.
H319	ZPŮSOBUJE VÁŽNÉ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ.
H332	ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ.
H335	MŮŽE ZPŮSOBIT PODRÁŽDĚNÍ DÝCHACÍCH CEST.
H351	PODEZŘENÍ NA VYVOLÁNÍ RAKOVINY.
H361d	PODEZŘENÍ NA POŠKOZENÍ PLODU V TĚLE MATKY.
H410	VYSOČE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.
EUH401	DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
P202	NEPOUŽÍVEJTE, DOKUD JSTE SI NEPŘEČETLI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NEPOROZUMĚLI JIM.
P280	POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/ OCHRANNÝ ODĚV/OCHRANNÉ BRÝLE/ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT.
P261	ZAMEZTE VDECHOVÁNÍ PAR/AEROSOLŮ
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P501	Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.
SP 1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm.h) zákona č.326/2004 Sb., v platném znění.	
Před použitím si přečtete přiložený návod k použití.	

Evidenční číslo přípravku:	5338-0
Držitel rozhodnutí o povolení:	NUFARM GmbH & CoKG, St.-Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Rakousko, tel.: +43-732-6918 0
Výrobce přípravku:	Nufarm UK Limited, Wyke lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire BD 12 9EJ, Velká Británie
Balení a objem:	HDPE kanystr 10 l šroubový uzávěr
Cisté množství přípravku:	10 L
Datum výroby:	uveďeno na obalu
Číslo šarže:	uveďeno na obalu
Doba použitelnosti:	2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Balení 10 l

VAROVÁNÍ



0117/CZ/VS
B0733-006 0117



Nufarm

Grow a better tomorrow.

Působení přípravku:

TIMPANI je fungicid obsahující směs účinných látek s odlišným mechanismem účinku: chlorothalonil narušuje enzymatické a metabolické procesy buněčné membrány hub; tebukonazol je DMI fungicid narušující biosyntézu sterolu.

Rozsah povoleného použití:**TIMPANI**

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkováni, místečnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k SO 3) k OL	4) pozn. k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
Pšenice ozimá	Branicnatka pšeničná	2 l/ha	35	1) od 30 BBCH, do 61 BBCH	
Ječmen ozimý	Rhynchosporiová skvrnitost ječmene	2 l/ha	35	1) od 30 BBCH, do 59 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizni.

Plodina, oblast použití	Dávka v/ha	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
pšenice, ječmen	200-400 l/ha	postřik	1x

Přípravek dosahuje proti branicnatce pšeničné a proti rhynchosporiové skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Při aplikaci v pšeničné ozimé v podmínkách silného infekčního tlaku branicnatky pšeničné nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
pšenice ozimá, ječmen ozimý	4	4	4	4

Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Příprava postřikové kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme vodou na požadovaný objem.

Čištění aplikačního zařízení:

Po aplikaci přípravku vypláchnout nádrž, rozvod kapaliny a trysky čistou vodou. Zbytek roztoku oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou. Aplikační zařízení se omyje vodou nebo se použije čisticích prostředků. V případě použití čisticích prostředků postupovat podle návodu k jejich použití. Neponechávat nikdy zbytky aplikační kapaliny v nádrži aplikačního zařízení. Nádrž se po použití a umytí musí nechat dobře vyvětrat.

Podrobnější pokyny k ochraně osob, které manipulují s přípravkem, osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP):**Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci:**

ochrana dýchacích orgánů: není nutná, je-li práce prováděna ve venkovních prostorech při ředění polomaska podle ČSN EN 133 a ČSN EN 136 a příslušný filtr proti částicím podle ČSN EN 143, popř. polomaska proti částicím podle ČSN EN 149, v obou případech s integrovanou vrstvou aktivního uhlí nebo obličejovou masku

ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem dle přílohy A k ČSN EN 374-1

ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166
ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv oznažený značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.

ochrana hlavy: při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra
ochrana nohou: není nutná.
pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině fidice, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice a brýle pro případ poruchy zařízení.

Další omezení:

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jichy) provádějte ve venkovních prostorech s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Postřik provádějte jen za bezvětrí nebo mírného vánku, ve směru vo větru a od dalších osob.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.

Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci.

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejzete, nepijte a nekurte. Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte.

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyperete a OOPP očistíte.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čocky.

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotná a kojící ženy a pro mladistvé.

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

První pomoc:**Všeobecné pokyny:**

Projeví-li se dýchací potíže nebo přetrvávající zdravotní potíže (bolesti hlavy; stěžení, zarudnutí, pálení očí; porušení na alergickou kožní reakci, nevolnost apod.) nebo v případě pochybnosti urychleně kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání:

Přerušete expozici, přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasazení kůže:

Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasazené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

První pomoc při zasazení očí:

Vyplychněte oči alespoň velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čocky, jsou-li nasazené, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čocky nelze vzadu použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití:

Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem. Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Podmínky správného skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větrákových skladech při teplotách +5 až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Skladovat mimo dosah dětí a zvířat. Chránit před mrazem a přímým slunečním světlem.

Přípravek není hořlavá kapalina dle ČSN 65 0201.


Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod:**Zákaz opětovného použití obalu.**

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení mohou předat do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené vysokoteplotní řízené spalovně. Oplachové vody se použijí na přípravu aplikační kapaliny. Zbytky postřikové kapaliny zředte vodou v poměru cca 1:10 a vystříkajte bez zbytku na ošetřené ploše, zbytky však nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. Případně neupotřebitelné zbytky přípravku se po předchozím nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako po obaly.

Dodatková informace držitele rozhodnutí o povolení:

Držitel rozhodnutí o povolení a právní zástupce nepřejímají žádnou zodpovědnost za ztráty a škody způsobené nesprávným skladováním a použitím přípravku, případným mícháním nebo sekvencím použitím s jinými přípravky jinak než v souladu s doporučeným použitím v této etiketě a v platném Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, takzda ani za následky vyplývající z použití přípravku během anebo před vznikem mimořádných pověťnostních podmínek, a nebo při ošetření odrůd, o kterých není držitel rozhodnutí o povolení/právní zástupci známo, že jsou mimořádně citlivé na poškození způsobené přípravkem.

TIMPANI® je ochranná známka společnosti Nufarm GmbH&CoGK, Rakousko.



9

UN No. 3082

0117/CZ/RS
B0733-007 0117